

El Flamenco del Caribe ilumina la Península

Infografía | Gerardo Núñez y Jesús Argueta

El profuso litoral yucateco, bordeado por la densidad de su húmeda selva, majestuosa y misteriosa que desemboca en los manglares repletos de vida silvestre, guarda un tesoro único, regalo de la naturaleza para todo México y el mundo: la presencia del flamenco del Caribe, una especie de ave fuera de lo común de tamaño considerable que, erguida con elegancia en sus largas y delgadas patas, anda en grupos como en pasarela bajo un portentoso abrigo de plumas brillantes rojizas que irradian el hermoso paisaje de la Costa Esmeralda, como si pudiera ser más espectacular aún.

Cortinas de aves rosadas pintan el contraste del intenso azul del limpio cielo peninsular, cuando levantan el vuelo en busca de su preciado alimento en zonas de baja marea, espectáculo que atrae a personas de cualquier rincón del orbe y encantan su mirada, pues son escasas las regiones del planeta en donde puede encontrarse a este ejemplar. En esta edición de **POR ESTO!**, se detallan los aspectos de la vida del flamante habitante de Yucatán, y que se puede admirar de cerca desde el mangle de Celestún, pasando por las salineras de Telchac, Yaymitún, Dzilam, El Cuyo y hasta Río Lagartos.

CARACTERÍSTICAS

Especie amenazada
Por la cacería, la pérdida de hábitat, contaminación, las aeronaves de bajo vuelo y los cambios de uso de suelo.

Longevidad
La especie se registra desde hace unos 70 mil años. Alcanzan 40 años de vida en libertad y hasta 60 en cautiverio.

Comportamiento
Son sociables, monógamos y no son agresivos ni territoriales. En caso de sentirse amenazados persiguen y dan picotazos.

Comunicación
Sus llamadas son ruidos como graznidos y cacareos, parecidos a los gansos.

Alimentación
Pequeños crustáceos, moluscos, anélidos, insectos, larvas, hojas en descomposición, algas y diatomeas, bacterias y protozoos.

Cabeza bajo el agua
Incrusta el pico en el suelo, filtra del lodo y traga, por lo que pasan casi todo el día alimentándose. Obtienen agua dulce de la lluvia.

Depredadores
Águilas, buitres y cigüeñas, quienes cazan a los huevos o a los polluelos. Además de leopardos, zorros, jabalíes y cocodrilos.

CABEZA

Cráneo

Sentidos
Vista y el oído muy desarrollado. Cuello notablemente largo, y cabeza pequeña.

Estructura ósea
Cráneo desmognato holorrino, con dieciséis a veinte vértebras cervicales.

Pico
Curvo y más grueso en el segmento inferior. Tiene diminutas placas de queratina con pelillos para filtrar alimento.

40 MIL
ejemplares contabilizados en el humedal mexicano durante el 2018

FLAMENCO DEL CARIBE O AMERICANO

Se ubican en México, las islas del Caribe, Florida y costas de Venezuela y Colombia. Existen otras especies en zonas tropicales de casi todo el mundo.

MÉXICO

Dentro del territorio nacional, se ubica únicamente en la Península de Yucatán, desde Celestún hasta Río Lagartos. Se pueden admirar prácticamente todo el año debido a la presencia de una gran colonia residente.

Migración después del invierno, recorren hasta 300 km de Occidente a Oriente, donde ubican su zona de anidación, entre mayo y julio, cuando llegan al lugar para reproducirse.

PRESENCIA MUNDIAL

Hábitat:
Zonas tropicales cercanas al mar, con grandes lagos, manglares o lagunas someras con alta concentración de sal y poco profundas, donde hallan su alimento.

ESPECIES CONOCIDAS

Flamenco americano
Phoenicopterus ruber o del Caribe: Islas del las Antillas, Yucatán, Florida, Venezuela y Colombia.
Phoenicopterus chilensis: Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador.
Phoenicopterus andinus: Perú, Chile, Argentina y Bolivia.
Phoenicoparrus jamesi: Perú, Chile, Paraguay, Argentina y Bolivia.

Flamenco Común
Phoenicopterus roseus:
África: Oeste Subsaariano.
Asia: Costas de la India.
Europa: Mediterráneo.

Flamenco Enano
Phoeniconaias minor:
India, Pakistán, Yemen, Omán, Irán y Sri Lanka.

Altura en adultos:
1.20 metros, hembras
1.45 metros, machos

Peso:
Hembras: 2.2 kilos
Machos 2.8 kilos

Patatas
Anisodáctilos, con tres dedos hacia adelante, uno hacia atrás y una membrana entre ellos. Duermen sobre una pata y la cambian casi inconscientemente.

Vuelo
Toman impulso para alzar el vuelo; en el aire alargan su cuello y sus patas, pero no saben planear como otras aves, por lo que nunca dejan de mover sus alas.

Parvadas
Integradas desde una decena hasta cientos de ejemplares. Cuando vuelan en grupo, llegan hasta los 60 kilómetros por hora.

REPRODUCCIÓN

Cortejo
Los machos realizan exhibiciones grupales, de modo que mueven sus cuellos o levantan las alas simultáneamente.

Reproducción
Alcanzan la madurez sexual de los 2-6 años. Las hembras suelen tener su primera cría alrededor de los 6 años.

Nido
Montículo de barro en forma de cono de unos 30 centímetros de altura, con una oquedad en la parte superior.

Incubación
1 o 2 huevos, de 27 a 31 días bajo cuidado. De 5 a 8 días posteriores a la eclosión, el polluelo deja el nido.